

# 农作物病虫情报

第八期

(2022年11月08日发布)

云浮市农业农村局  
地址：云浮市市区兴隆路45号

电话：0766-8923096  
E-mail: kjk3096@126.com

---

## 冬种马铃薯种植前期处理技术意见

当前我市已进入冬种马铃薯前期工作，根据历年观察，冬种马铃薯发生病虫害主要有早疫病、晚疫病、青枯病、病毒病、茎腐病和蚜虫等，为确保马铃薯生产安全，提出如下马铃薯种植前期处理技术意见：

### 一、品种选择

选用优质脱毒原种一代种薯，适合本地冬种的品种有陇薯7号、云薯306等。每亩备种175公斤左右，种薯一般选择每个50-100克左右为宜。

### 二、种薯处理

1、切薯：应把霉烂、混杂薯捡除，个体在50克左右的种薯整薯播种，100克以上的根据芽眼数目，将种薯切成2-3块，每块上应有1个顶芽和1个侧芽。刀具在切块前用洗涤剂洗净油污，并用高锰酸钾兑成0.1%药液对刀具杀菌，每切1个种薯须消毒一次。

2、种薯消毒：可选用甲霜灵和滑石粉先以1:50的比例拌种消毒，再以1:50的比例拌种一次；或选用68%精甲霜·代森锰锌水分散粒剂500-800倍液拌种消毒。拌种处理的种薯要晾干才能播种。

3、催芽：落地集中催芽。

### **三、播种适期**

马铃薯适宜在冷凉的气候下生长，生长发育适宜温度17-21℃，本地最佳播期在11月上旬至中旬。未打破休眠期的种薯不宜播种，必须打破休眠才能播种。

### **四、田间管理**

#### **1、加强肥水管理**

出苗前保持土壤湿润，促进成苗。播种后1周灌水，单沟排灌，保证土壤湿润又不能受涝。保证出苗整齐。

#### **2、病虫害防治**

出苗后注意防治地下害虫蝼蛄、小地老虎和金针虫等可采用0.5%噻虫嗪+0.5%联苯菊酯颗粒剂2-4公斤加细土30-40公斤拌匀开沟施或顺垄撒施，或90%敌百虫对水适量拌100千克炒香的麦麸制成毒饵进行诱杀。